

Exercice 1

Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2+y^2)}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Montrons que f n'est pas de classe C^2

On pose $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$ où $r > 0$ et $\theta \in [0, 2\pi]$

et on obtient $|f(x,y) - f(0,0)| = |f(r \cos \theta, r \sin \theta) - f(0,0)|$

$$= \left| \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta (r^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta))}{r^2} \right| = r^2 |\cos \theta \sin \theta (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)|$$

$$\xrightarrow{r \rightarrow 0} 0$$

Ainsi, f est continue en $(0,0)$. Or $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$
 f est continue en tant que quotient de fonctions continues.
 Alors f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

De plus, sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ la fonction f est de classe C^∞

$$\text{On a } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f((0,0) + t(1,0)) - f(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t,0) - f(0,0)}{t} = 0$$

$$\text{et } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f((0,0) + t(0,1)) - f(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0,t) - f(0,0)}{t} = 0$$

Ainsi $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$ existe et vaut 0 et $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$ existe et vaut 0.

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^* \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{(3x^2y - y^3)(x^2+y^2) - 2x^2y(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{3x^4y + 3x^2y^3 - y^3x^2 - y^5 - 2x^4y + 2x^2y^3}{(x^2+y^2)^2}$$

$$= \frac{-y^5 + x^4y + 4x^2y^3}{(x^2+y^2)^2} = g(x,y)$$

De même $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$ $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{(x^3 - 3y^2x)(x^2+y^2) - 2yx(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}$

$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{x^5 + x^3y^2 - 3y^2x^3 - 3y^4x - 2y^2x^3 + 2xy^4}{(x^2+y^2)^2}$$

$$= \frac{x^5 - y^4x - 4x^3y^2}{(x^2+y^2)^2} = h(x,y)$$

Par ailleurs, $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g((0,0) + t(1,0)) - g(0,0)}{t}$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t,0) - g(0,0)}{t} = 0 = \frac{\partial g}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0)$$

De plus, $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(0,t) - g(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-t^5}{t^5} = -1$

$$= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)$$

De même, $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(t,0) - h(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{t} = 1 = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0)$

Ainsi $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)$. La contrepartie du théorème de Schwarz prouve que f n'est pas de classe $\mathcal{C}^2$.

Exercice 2:

Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x,y) = x^3 + y^2 - xy$

* Étudions les extremas de f :

Tout d'abord on recherche les points critiques de f .

(x_0, y_0) est un point critique de $f \iff \nabla f(x_0, y_0) = 0$

$$\iff \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x_0^2 - y_0 = 0 \\ 2y_0 - x_0 = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x_0 = 2y_0 \\ 12y_0^2 - y_0 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_0 = 2y_0 \\ y_0(12y_0 - 1) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_0 = 2y_0 \\ y_0 = 0 \\ \text{ou } y_0 = \frac{1}{12} \end{cases}$$

Ainsi les points critiques de f sont les points $(x_0, y_0) = (0, 0)$; $(x_0, y_0) = (\frac{1}{6}, \frac{1}{12})$

De plus, la fonction f est de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = 6x$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = 2$. D'après le Théorème de Schwarz

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = -1$$

Ainsi, la matrice Hessienne de f est donnée par

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} 6x & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}. \text{ De plus } \det(H_f(x,y)) = 12x - 1$$

Ici $\det(H_f(0,0)) = -1 < 0$

De plus, $\det(Hf(1/6, 1/2)) = 12 \times \frac{1}{6} - 1 = 1 > 0$

Le premier terme sur la diagonale est donné par $1 > 0$

Finalement, $(0,0)$ est un point selle et $(1/6, 1/2)$ est un minimum local strict

Exercice 3: ✓

On considère la 1-forme différentielle

$$w = ze^{zy} dx + (xz^2 e^{zy} + 2y) dy + (x + xyz) e^{zy} dz$$

sur $\mathbb{R}^3$.

On cherche une fonction f telle que $w = df$.

Ici, on peut montrer que w est exacte (w est fermée et $\mathbb{R}^3$ est étoilé).

$$\text{Ainsi } df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

Par identification

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) = ze^{zy} & (1) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) = xz^2 e^{zy} + 2y & (2) \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) = (x + xyz) e^{zy} & (3) \end{cases}$$

On intègre (1) par rapport à x et on trouve $f(x,y,z) = xze^{zy} + \alpha(y,z)$ avec $\alpha: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction.

$$\text{Or } \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) = z^2 x e^{zy} + \frac{\partial \alpha}{\partial y}(y,z) = xz^2 e^{zy} + 2y$$

$$\text{Donc } \frac{\partial \alpha}{\partial y}(y,z) = 2y \Rightarrow \alpha(y,z) = y^2 + \beta(x)$$

où $\beta: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction

Aussi, $f(x, y, z) = xze^{zy} + y^2 + \beta(x)$

De même $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = ze^{zy} + \beta'(x) = ze^{zy}$ d'après (1)

$\Rightarrow \beta'(x) = 0 \Rightarrow \beta(x) = K$ où $K \in \mathbb{R}$

Finalement, $f(x, y, z) = xze^{zy} + y^2 + K$, $K \in \mathbb{R}$

Exercice 4 :

Soit le champ de vecteurs $\vec{V} = \begin{pmatrix} -x \\ 2x \cos(z) \\ z - x^2 \end{pmatrix}$ sur $\mathbb{R}^3$

Trouvons $\vec{W}$ tel que $\vec{V} = \text{rot } \vec{W}$

Par définition, $\text{rot } \vec{W} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} W_x \\ W_y \\ W_z \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \text{rot } \vec{W} = \begin{pmatrix} \frac{\partial W_z}{\partial y} - \frac{\partial W_y}{\partial z} \\ \frac{\partial W_x}{\partial z} - \frac{\partial W_z}{\partial x} \\ \frac{\partial W_y}{\partial x} - \frac{\partial W_x}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 - (-x) \\ 0 - \frac{\partial \psi(x, z)}{\partial x} \\ z - \frac{\partial \phi}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{cases} -x = -x \\ 2x \cos(z) = -\frac{\partial \psi}{\partial x}(x, z) \\ z - x^2 = z - \frac{\partial \phi}{\partial y}(x, y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial \psi}{\partial z}(x, z) = 0 \\ \frac{\partial \psi}{\partial x}(x, z) = -2x \cos(z) \\ \frac{\partial \phi}{\partial y}(x, y) = x^2 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \psi(x, z) = C_1 + \beta(x) \text{ où } \beta: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ et } C_1 \in \mathbb{R} \\ \psi(x, z) = -x^2 \cos(z) + d(z) \text{ où } d: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ \phi(x, y) = x^2 y + \gamma(x) \text{ où } \gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \end{cases}$

Où $\phi(x,0) = W_x(x,0,z) = 1$ ce qui implique

$$\gamma(x) = 1 \text{ et donc } W_x(x,y,z) = x^2 y + 1$$

De plus, $W_z(0,y,z) = \psi(0,z) = 0$

On obtient $\alpha(z) = 0 \Rightarrow \alpha(z) = K$ où $K \in \mathbb{R}$

Ainsi, $\psi(x,z) = -x^2 \cos(z) + K$ où $K \in \mathbb{R}$. Or $\psi(0,z) = 0 \Rightarrow K = 0$


Finalement $\vec{W} = \begin{pmatrix} x^2 y + 1 \\ xz + \sin(y) \\ x^2 \cos(z) \end{pmatrix}$

Exercice 5:

Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x,y) \mapsto x^2 y$

et $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / y = x^2 \text{ et } y = 1 - x^2\}$

Calculons $I = \iint_D f(x,y) dx dy$



On a $y = x^2 \geq 0$ et donc $x^2 \leq 1$
 d'où $x \in [-1, 1]$. De plus, $x^2 \leq 1 - x^2$
 soit $x \in [-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}]$

Ainsi $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / -1/\sqrt{2} \leq x \leq 1/\sqrt{2} \text{ et } x^2 \leq y \leq 1 - x^2\}$

$$I = \int_{-1/\sqrt{2}}^{1/\sqrt{2}} \int_{x^2}^{1-x^2} x^2 y dy dx$$

$$= \int_{-1/\sqrt{2}}^{1/\sqrt{2}} x^2 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^{1-x^2} dx$$

$$= \int_{-1/\sqrt{2}}^{1/\sqrt{2}} \frac{x^2}{2} (1 - x^2)^2 - x^4 dx = \int_{-1/\sqrt{2}}^{1/\sqrt{2}} \frac{x^2}{2} (1 - 2x^2 + x^4) dx$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_{-1/\sqrt{2}}^{1/\sqrt{2}} - \left[\frac{1}{5} x^5 \right]_{-1/\sqrt{2}}^{1/\sqrt{2}}$$


$$= \frac{1}{6} \left(2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3 \right) - \frac{1}{5} \left(2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^5 \right)$$

$$\text{Ainsi, } I = \frac{1}{3} \frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{5} \frac{2}{4\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{12} - \frac{\sqrt{2}}{20} = \frac{4\sqrt{2}}{120} = \frac{\sqrt{2}}{30}$$

Exercice 6:

$$\text{Soit } D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + 2y + 3z \leq 6\}$$

$$\text{Calculons } \iiint_D 1 \, dx \, dy \, dz = I$$



Ici, $x \leq 6$ par exemple (on pourrait aussi borner y ou z par 6)

$$\text{On a donc } 2y + 3z \leq 6 - x \Leftrightarrow z \leq \frac{6 - x - 2y}{3}$$

$$\text{De plus, } y + \frac{3}{2}z \leq \frac{6 - x}{2} \Leftrightarrow y \leq \frac{6 - x}{2}$$

$$\text{Donc } D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq x \leq 6; 0 \leq y \leq 3 - \frac{1}{2}x; 0 \leq z \leq \frac{6 - x - 2y}{3}\}$$

$$\text{Alors, } I = \int_{x=0}^6 \int_{y=0}^{3-\frac{x}{2}} \int_{z=0}^{\frac{6-x-2y}{3}} 1 \, dz \, dy \, dx = \int_{x=0}^6 \int_{y=0}^{3-\frac{x}{2}} \left[z \right]_0^{\frac{6-x-2y}{3}} dy \, dx = \int_{x=0}^6 \int_{y=0}^{3-\frac{x}{2}} \frac{6-x-2y}{3} dy \, dx$$

$$I = \int_{x=0}^6 \left[\left(\frac{6-x}{3} \right) y - \frac{2}{3} \frac{y^2}{2} \right]_0^{\frac{6-x}{2}} dx$$

$$= \int_{x=0}^6 \left[\left(\frac{6-x}{3} \right) \left(\frac{6-x}{2} \right) - \frac{1}{3} \left(\frac{6-x}{2} \right)^2 \right] dx$$

$$= \frac{1}{6} \int_{x=0}^6 (6-x)^2 dx - \frac{1}{12} \int_0^6 (6-x)^2 dx$$

$$= \frac{1}{12} \int_0^6 (6-x)^2 dx = \frac{1}{12} \left[-\frac{1}{3} (6-x)^3 \right]_0^6 = -\frac{1}{36} (0 - 6^3) = \frac{216}{36} = 6$$